

## Эффект симпатолитической терапии моксонидином на уровни адипонектина крови у женщин с артериальной гипертензией

Effects of sympatholytic therapy with moxonidine on serum adiponectin levels in hypertensive women

Ebinc H., Ozkurt Z.N., Ebinc F.A., Ucardag D., Caglayan O., Yilmaz M.

J Int Med Res. 2008 Jan-Feb; 36(1):80-7.

Современная медицина сталкивается с большим кругом трудностей, связанных с полипрогмазией современных терапевтических подходов. Желание врача — всесторонне помочь больному и решить все или, по крайней мере, основные проблемы со здоровьем. К сожалению, лекарственных препаратов, позволяющих сделать это не так много. Моксонидин (Физиотенз) относится именно к этой группе препаратов, что находит все больше и больше подтверждений в международных исследованиях.

Так, группа турецких ученых университета города Кириккале исследовала влияние моксонидина на уровни липидов, адипонектина, инсулинорезистентность, функцию почек и микроальбуминурию у 55 женщин с эссенциальной гипертензией без сахарного диабета и 53 пациенток группы контроля. Пациентки с гипертензией получали моксонидин в течение 12 недель. В базальных условиях у

пациентов основной группы были обнаружены повышенные уровни липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов, общего холестерина, уровня глюкозы натощак, экскреции альбумина с мочой, индекса инсулинорезистентности НОМА-IR, а также снижение уровней липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), клиренса креатинина и адипонектина крови по сравнению с группой контроля. Обнаружена обратная корреляционная связь уровня адипонектина и индекса НОМА-IR. Лечение моксонидином, по данным авторов, приводило к улучшению показателей метаболического статуса пациентов и инсулинорезистентности, что было связано с повышением уровней адипонектина у пациентов с эссенциальной гипертензией на фоне лечения препаратом.

*Перевод Пигаровой Е.А.*

# Гипертония и избыточный вес: доказанный выбор – Физиотенз



МОКСОНИДИН  
**Физиотенз®**  
СЕЛЕКТИВНЫЙ АГОНИСТ ИМИДАЗОЛИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ

- Надежно контролирует артериальное давление в течение 24 часов<sup>1,2</sup>
- Способствует снижению веса<sup>3</sup>
- Улучшает чувствительность тканей к инсулину<sup>4</sup>

**Оптимальная дозировка**  
**0,4 мг в сутки<sup>1-3</sup>**



1. Kupper H.E., Jager B.A., Luszick J.H., et al. J Hypertension 1997; 15: 93-97 2. Trieb G., Jager B., Hughes P.R., et al. Eur J Clin Res 1995; 7: 227-240 3. Moxonidine in the treatment of overweight and obese patients with the metabolic syndrome: a postmarketing surveillance study. J Hum Hypertens 2004 Sep; 18 (9): 669-73 4. Lithell H. Moxonidine improves insulin resistance in obese, insulin resistant hypertensive patients. 17th ISH, Amsterdam, June 7, 1998

Регистрационное удостоверение П № 015691/01 от 24.05.2004



**SOLVAY  
PHARMA**

119334, г. Москва, ул. Вавилова, 24, этаж 5.  
Тел.: (495) 411-69-11, факс: (495) 411-69-10  
E-mail: [info@solvay-pharma.ru](mailto:info@solvay-pharma.ru)  
[Http://www.solvay-pharma.ru](http://www.solvay-pharma.ru)